

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ/УЗДГ/ДОПЛЕР НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Современный метод исследования, который используется для диагностики патологических изменений нижней полой вены.

Подготовка к исследованию

- **За 3 дня до обследования** желательно исключить из рациона продукты, усиливающие газообразование в кишечнике (сырые овощи, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, а также высококалорийные кондитерские изделия — пирожные, торты).
- **В дни подготовки к исследованию (за 2 дня)** следует принимать энтеросорбенты, которые помогут уменьшить газообразование в кишечнике: активированный уголь 250 мг 3 раза в сутки через 1 час после еды из расчета 1 таблетка на 10 кг веса. Например, при весе в 60 кг нужно принимать 6 таблеток в сутки — по 2 таблетки 3 раза в день в течение 2-х дней.
- **Если вы принимаете лекарства**, обязательно предупредите об этом лечащего врача и получите рекомендации о приеме лекарств в день исследования.
- **Воздержитесь от курения** в день исследования.

Если ранее вы уже проходили данное УЗИ, желательно при себе иметь его результаты – это поможет корректно отследить динамику.