

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (С МИКЦИЕЙ) ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 2-Х ЛЕТ

УЗИ почек, мочевого пузыря рекомендовано сделать в случаях нарушения мочеиспускания, болей в области поясницы, изменений в анализах или внешнем виде мочи.

В ходе процедуры оценивается множество параметров, совокупность которых позволяет подтвердить или исключить заболевания почек, а при выявлении каких-либо патологий направить пациента на дополнительные исследования.

Подготовка к исследованию

Исследование проводится на полный мочевой пузырь.

- **За 1-2 суток до проведения исследования** следует убрать из рациона ребенка продукты и блюда, вызывающие повышенное газообразование, а именно: бобовые, фрукты, копченые колбасы и сыры, кисломолочные продукты и ржаной хлеб.
- Если же у ребенка вне зависимости от питания **часто наблюдается вздутие живота, то за пару часов до** исследования можно принять препараты из группы пеногасителей в возрастной дозировке (Эспумизан, Боботик).
- **Накануне** самого УЗИ мочевого пузыря и почек желательно отказаться от приема пищи как минимум за 3 часа до процедуры.
- **За 60-90 минут до обследования** необходимо выпить 100 мл негазированной воды и не мочиться.

Если ранее вы уже проходили данное УЗИ, желательно при себе иметь его результаты – это поможет корректно отследить динамику.